



## QUELQUES CONSEILS SUITE A UNE CHIRURGIE ENDODONTIQUE.

---

**LOUIS Pascal**  
**Dentiste L.S.D.**  
**Endodontie exclusive.**

Rue de Mons 84 bte 3  
1400 Nivelles  
☎: 067 63 74 68  
[endo.p.louis@gmail.com](mailto:endo.p.louis@gmail.com)

- Appliquer de la glace sur la joue, la lèvre ou le menton 3 à 4 fois par jour minimum le jour de l'intervention et éventuellement le lendemain matin.

Attention, ne jamais mettre la glace directement sur la peau.

- Prendre des anti-inflammatoires 3x par jour pendant 3 jours (sauf si contre-indication).

Si malgré cela des douleurs apparaissent, prenez du paracétamol 1g (DAFALGAN, PERDOLAN, ...) entre les prises d'anti-inflammatoires.

- Faire des bains de bouche 3 fois par jour pendant 3 jours (CORSODYL, ELUDRIL,...) à partir du lendemain soir.

- Vous devez vous brosser les dents le jour même et les suivants, mais évitez de brosser dans la zone d'intervention le jour même.

Dès le lendemain SOIR, vous devez reprendre un brossage normal mais prudent à cet endroit, avec une brosse à dent souple. Des saignements et des sensibilités peuvent être présents, ce qui est tout à fait normal.

- Malgré toutes les précautions prises, il se peut, comme pour toute intervention chirurgicale dans la sphère orale, qu'un gonflement voire un hématome apparaisse au niveau de la joue, de la lèvre ou sous la mâchoire inférieure. Ce gonflement disparaît en général dans les 3 jours après l'intervention et l'hématome dans les 7 jours.

- En cas de question ou de soucis, n'hésitez surtout pas à nous téléphoner.